

جدول مقایسه جراحی های چاقی

روش جراحی	روش انجام	میزان تهاجمی بودن	BMI مناسب	قابل BMI پوشش بیمه	دوره نقاهت	تأثیر بر ریزه خوار ی	تأثیر بر اشتها	سرعت کاهش وزن	دائمی/غیرقا بل بازگشت
اسلیو معده	لاپاراسکو پی	تهاجمی	بین 35 تا 40 و بیشتر با بیماری همراه	35 به بالا با بیماری	1-2 روز	متوسط	زیاد	سریع	بله
بای پس کلاسیک (RYGB)	لاپاراسکو پی	تهاجمی	بین 35 و 40 و بیشتر همراه با بیماری	35 به بالا با بیماری	2-3 روز	زیاد	زیاد	خیلی سریع	بله
مینی بای پس (MGB)	لاپاراسکو پی	تهاجمی	بین 35 و 40 و بیشتر همراه با بیماری	35 به بالا با بیماری	1-2 روز	زیاد	زیاد	سریع	بله
ساسج معده (SASI)	لاپاراسکو پی	تهاجمی	بین 35 و 40 و بیشتر همراه با بیماری متابولیک	محدود	2-3 روز	زیاد	خیلی زیاد	سریع	بله
سوئیچ دوازدهه (DS)	لاپاراسکو پی	تهاجمی	بیشتر از 45 (چاقی شدید)	محدود	3-4 روز	زیاد	خیلی زیاد	خیلی سریع	بله
حلقه معده (Band)	لاپاراسکو پی	نیمه تهاجمی	بین 35 تا 40	محدود	1 روز	متوسط	متوسط	متوسط	قابل برداشت
بالون معده	آندوسکوپ ی	غیرتهاجمی	بین 30 تا 35	خیر	ترخیص روزانه	متوسط	کم	متوسط	موقت
بوتاکس معده	آندوسکوپ ی	غیرتهاجمی	بین 27 تا 32	خیر	ترخیص روزانه	کم	کم	کم	موقت